

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 30-4-71 175007

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "MIDI-PYRENEES"

(ARIÈGE, AVEYRON, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT,
HAUTES-PYRENEES, TARN, TARN-ET-GARONNE)

(Tél. 86-31-55 et 86-32-55)

PROTECTION DES VEGETAUX - Rue St-Jean prolongée
B. P. n° 20 — 31 - BALMA

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

S/Rég. recettes Dir. Dép. Agri. Hte-Gne
Rue St-Jean prolongée - BALMA
C. C. P. 8612-11 TOULOUSE

- Supplément N° 4 au bulletin N° 127 d'avril 1971 -

1971-12

ARBRES FRUITIERS A PEPINS

-Tavelures du poirier et du pommier :

En raison des dernières pluies, souvent abondantes, qui ont lessivé le dernier traitement, il est nécessaire d'effectuer une nouvelle application, d'autant plus que de nouveaux germes provenant de taches, qui vont probablement apparaître avant le 30 avril, vont s'ajouter aux ascospores encore nombreuses dans les feuilles mortes.

-Oïdium du pommier :

Dans les vergers atteints, continuer à assurer la protection.

-Hoplocampe des pommes :

Dans les quelques secteurs généralement proches des agglomérations, où cet insecte commet habituellement des dégâts, appliquer un traitement lorsque la chute des pétales est bien amorcée avec l'un des produits mentionnés contre les hoplocampes des prunes et des poires.

TOUS ARBRES FRUITIERS

-Araignée rouge (Panonychus ulmi) :

Nous rappelons les termes du précédent bulletin.

Surveiller les arbres et intervenir avec un produit spécifique dès que le seuil indiqué est atteint (20 à 30 formes mobiles par feuille, en moyenne).

VIGNE

-Black-rot :

Les projections des germes hivernants (ascospores) au cours des pluies ont commencé alors que la vigne devient réceptive. Uniquement dans les foyers, appliquer un premier traitement soigné avec un produit cuprique de préférence.

-Mildiou :

Actuellement, les oeufs d'hiver du champignon sont parvenus à maturité et la formation des premiers foyers de la maladie est possible dans certaines situations.

En conséquence, il est vivement recommandé :

- de supprimer systématiquement les végétations inutiles proches du sol sur lesquelles s'établissent les premiers foyers ;
- d'assurer l'écoulement des eaux de pluies afin d'éviter la formation de "flaques".

-Araignées rouges et jaunes :

Les éclosions d'oeufs d'hiver d'araignées rouges (Panonychus ulmi) sont largement commencées alors que les araignées jaunes (E. carpini) reprennent leur activité.

7.1.248

Seulement dans les vignes fortement envahies, appliquer dans les jours qui viennent, par beau temps, un acaricide spécifique.

Une vigne étant rarement contaminée dans son ensemble, il y aurait intérêt à limiter l'application aux foyers ou zones atteintes.

Le cas échéant, dans le cas d'un doute, des échantillons peuvent nous être adressés, fraîchement récoltés et placés dans une poche en matière plastique.

-Oïdium :

Dans les vignes sensibles présentant 3 à 4 feuilles étalées, il y aurait intérêt à effectuer un soufrage par poudrage au cours des prochains jours, si cela n'a pas encore été fait.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles,

J. BESSON - E. JOLY

BALMA, le 28 Avril 1971
Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"Midi-Pyrénées"

L. INBERT.

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de "MIDI-PYRENEES".

Le Directeur-Gérant : L. BOUYX.